

## Kinikini (Amerikaanse torenvalk)

|                      |  |
|----------------------|--|
| Latijnse naam:       | <i>Falco sparverius</i>  |
| Lengte:              | 19-21 cm Het mannetje is iets kleiner dan het vrouwtje.  |
| Gewicht:             | Man: 103-120 gram, vrouw: 126-166 gram.  |
| Kleur:               | Het mannetje van de Amerikaanse torenvalk heeft een blauwgrijze kop met roestbruine kruin, nek, rug en staart. Hij heeft zwarte vlekken op flank en schouderblad. Het vrouwtje heeft een bruingestreepte vuile-gele borst. De nek, rug en staart zijn roestbruin.  |
| Voortplanting:       | De torenvalk bouwen zelf geen nesten en zijn ook niet kieskeurig over een nestplek. Ze maken de nesten van de andere vogels leeg en ze gebruiken het. Ze nesten en broeden ook op hoge gebouwen, in rotsholten en in bomen. Er worden 4 tot 6 eieren in de broedtijd tussen april en mei gelegd. Het vrouwtje broedt de eieren uit en het duurt 26 tot 31 dagen. De eieren zijn wit met lichtbruine vlekken. |
| Woonomgeving:        | Overal komt het valkje voor, zowel in de "Cunucu" als in woonwijken.   |
| Verdedigingsmethode: | Ze zijn territorium gevoelig en verdrijven soortgenoten door agressieve luchtaanvallen als deze hun broed of voedsel gebied betreden.  |
| Voedsel:             | Hagedissen, kleine vogels of insecten zoals: sprinkhaan, Libellen en muizen. De vogel kan uren op een hoge uitkijkpost zitten en zo de omgeving afzoeken naar geschikte prooien. Waarvan hij dan naar beneden duikt op zijn prooien.   |
| Vijanden:            | Mensen.  |

- De kleinste roofvogel op onze eilanden.

